

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕПСАН-Р

**Торговое название препарата:** ПЕПСАН-Р

**Лекарственная форма:** гель для приема внутрь

**Состав:**

1 саше (10 г) содержит:

*активные вещества:*

Диметикон.....3,000 г

Гвайазулен.....0,004 г

*вспомогательные вещества:*

Сорбитол 70% кристаллизуемый.....1,429 г

(Соответствующее количество сорбитола.....1,000 г)

Каррагенаты .....0,130 г

Цикламаты натрия .....0,012 г

Метилпарагидроксибензоат .....0,015 г

Масло мяты перечной .....0,003 г

Очищенная вода .....5,407 г

**Описание:** гель голубого цвета с мятным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

**Код АТХ:** А03АХ

### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

*Гвайазулен* – обладает противовоспалительным эффектом.

*Диметикон* – гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала, обладает противовспенивающим действием.

### **Показания к применению**

Гастралгия (в качестве симптоматического средства), функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся метеоризмом.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. Принимать содержимое от 1 до 2 пакетиков 2-3 раза в сутки перед едой (курс лечения определяется индивидуально), либо в случае возникновения боли.

### **Побочные действия**

В редких случаях возможны аллергические реакции, такие как сыпь, зуд кожи, боли и вздутие живота.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Лекарственные взаимодействия**

Не выявлено.

### **Особые указания**

Препарат не содержит сахара и поэтому не противопоказан лицам, страдающим сахарным диабетом. ПЕПСАН-Р не обладает рентгенконтрастными свойствами.

В состав препарата входит сорбитол, поэтому не следует принимать данный препарат пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы.

Это лекарственное средство содержит метилпарагидроксибензоат и может вызвать аллергические реакции.

***Беременность и грудное вскармливание***

Возможно применение в период беременности и грудного вскармливания.

***Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами***

Не выявлено.

Если симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, рекомендуется обратиться к врачу.

**Передозировка**

Возможно усиление побочных реакций.

**Форма выпуска**

Гель для приема внутрь. По 10 г геля в саше из многослойного материала (отбеленная крафт-бумага/полиэтилен низкой плотности/алюминиевая фольга/полиэтилен низкой плотности). По 30 саше вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

Фарматис

Zone d'Activites Est n1 –BP20

60190 Estrees-Saint-Denis,

Франция

**Держатель РУ и выпуск серии**

Лаборатории РОЗА-ФИТОФАРМА, Франция.